

## Badania wymagane do zabiegu IVF/ICSI

**PACJENTKA:** przygotowująca się do pobrania komórek jajowych powinna mieć wykonane:

GR.KRWI (oryginalny wynik z laboratorium)

HBS antygen, HIV, WR (VDRL), HCV, p/c anty HBC

Różyczka IgG, IgM

Cytomegalia IgM, IgG

Toxoplazmoza IgG, IgM

Morfologia

APTT, INR

NA, K

glukoza

AMH

FSH (2-3dc)

TSH

USG PIERSI do 10 dnia cyklu

Cytologia

Czystość pochwy

Chlamydia T – wymaz z tarczy i kanału szyjki macicy oznaczany metodą PCR

Wymaz z kanału szyjki macicy na obecność: Ureoplasma, Mycoplasma (zależnie od wskazań decyduje lekarz)

\*KARIOTYP (zależnie od wskazań decyduje lekarz)

\*p/c HTL V-I, antygen RhD, malaria, T.crusi (dla pacjentów podróżujących lub pochodzących z obszarów endemicznych)

Badania wirusologiczne i wymazy z dróg rodnych ważne są przez okres 3 miesięcy. Badania hormonalne ważne są 6 miesięcy, USG piersi i cytologia ważne są 12 miesięcy.

**PACJENT:** przygotowujący się do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego powinien mieć wykonane:

GR.KRWI (oryginalny wynik z laboratorium)

HBS antygen, HIV, WR (VDRL), HCV, p/c anty HBC

Cytomegalia IgM, IgG

Semiogram (badanie nasienia z oceną morfologii plemników)

\*KARIOTYP, AZF, CFTR (zależnie od wskazań decyduje lekarz)

\*SCD (DFI) lub MSOME (ze wskazań lekarza)

Badania wirusologiczne ważne są przez okres 3 miesiące.

Przed rozpoczęciem leczenia należy dostarczyć podpisaną ZGODĘ DO PRZEPROWADZENIA ZABIEGU ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO oraz wyniki powyższych badań.

W przypadku par będących lub nie będących w związku małżeńskim, para dostarcza zgodne OŚWIADCZENIE potwierdzające, że pozostaje w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu.

W przypadku par będących lub nie będących w związku małżeńskim a korzystających z nasienia dawcy lub zarodków dawców należy dostarczyć zaświadczenie o złożeniu oświadczenia zgodnie z art. 751 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583); partner oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganą prokreacją z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta to potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.